RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Dipirona 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor.
1. Paracetamol 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor.
1. Dipirona 500 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 20 a 40 gotas de 6 em 6 horas se dor.
1. Paracetamol 200 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 35 a 55 gotas de 6 em 6 horas se dor.

2. Ibuprofeno 600 mg ---------- 21 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor por até 7 dias.
2. Cetoprofeno 100 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por até 7 dias.
2. Diclofenaco 50 mg ---------- 21 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor por até 7 dias.
2. Nimesulida 100 mg ---------- 14 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas se dor por até 7 dias.
2. Tenoxicam 20 mg ---------- 7 cps
Tomar 1 comprimido por dia se dor por até 7 dias.
2. Naproxeno 500 mg ---------- 7 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas, na crise.

USO ENDOVENOSO:

3. Dipirona 1 g/2 mL ---------- 1 ampola
Diluir 2 mL em 18 mL de água destilada e administrar via endovenosa de 6 em 6 horas.

4. Cetoprofeno 100 mg ---------- 1 frasco
Diluir em 100 mL de SF 0,9% e administrar via endovenosa em 30 minutos. Dose máxima: 300 mg/dia.

Instruções ao paciente:
Descansar em ambiente calmo e escuro. Aplicar compressa fria ou quente na testa ou nuca conforme preferência. Beber água, manter horários regulares de sono e refeições. Evitar abuso de analgésicos — usar no máximo 2 a 3 vezes por semana.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
pior dor de cabeça da vida, crise com duração acima de 72 horas, febre, vômitos em jato, manchas pelo corpo, rigidez de nuca, perda de força ou formigamento em um lado do corpo, dificuldade para falar, boca torta, alterações visuais, convulsões ou sonolência excessiva

__/__/__ _____

Data Carimbo e assinatura