RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Dipirona 500 mg ---------- 16 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
1. Paracetamol 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor.
1. Fenazopiridina 200 mg ---------- 1 cx
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas longe das refeições por até 2 dias se dor ao urinar. A urina ficará alaranjada durante o uso — é normal.
1. Dipirona 500 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 20 a 40 gotas de 6 em 6 horas se dor.
1. Paracetamol 200 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 35 a 55 gotas de 6 em 6 horas se dor.

Instruções ao paciente:
Aumentar a ingestão de água. Urinar sempre que sentir vontade e após relações sexuais. Manter higiene íntima adequada. Tomar o antibiótico até o fim mesmo com melhora dos sintomas.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
febre acima de 38°C, dor nas costas, vômitos, incapacidade de se alimentar ou beber água, parada de urina ou piora dos sintomas em 48 horas

_____ / _____ / _____

Data

_____

Carimbo e assinatura