RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 20 cps
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 5 dias.
1. Fosfomicina 3 g ---------- 1 envelope
Dissolver o conteúdo de 1 envelope em água e tomar, dose única.
1. Ciprofloxacino 500 mg ---------- 6 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias.
1. Sulfametoxazol + Trimetoprim 800/160 mg ---- 20 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.
1. Amoxicilina + Clavulanato 875/125 mg ---- 14 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias.
1. Cefalexina 500 mg ---------- 28 cps
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 7 dias.

Instruções ao paciente:
Aumentar a ingestão de água. Urinar sempre que sentir vontade e após relações sexuais. Manter higiene íntima adequada. Tomar o antibiótico até o fim mesmo com melhora dos sintomas.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
febre acima de 38°C, dor nas costas, vômitos, incapacidade de se alimentar ou beber água, parada de urina ou piora dos sintomas em 48 horas

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 20 cps
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 5 dias.
1. Fosfomicina 3 g ---------- 1 envelope
Dissolver o conteúdo de 1 envelope em água e tomar, dose única.
1. Ciprofloxacino 500 mg ---------- 6 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias.
1. Sulfametoxazol + Trimetoprim 800/160 mg ---- 20 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.
1. Amoxicilina + Clavulanato 875/125 mg ---- 14 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias.
1. Cefalexina 500 mg ---------- 28 cps
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 7 dias.

Instruções ao paciente:
Aumentar a ingestão de água. Urinar sempre que sentir vontade e após relações sexuais. Manter higiene íntima adequada. Tomar o antibiótico até o fim mesmo com melhora dos sintomas.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
febre acima de 38°C, dor nas costas, vômitos, incapacidade de se alimentar ou beber água, parada de urina ou piora dos sintomas em 48 horas

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico