RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

Orientação clinica

- Primeiro passo: Observe em ambiente calmo por cerca de 30 minutos, avaliando a resolução dos sintomas e a queda da PA.
- Sintomas que não são de PA: Dor musculoesquelética, ansiedade, evento emocional: trate com analgesia, ansiolítico e escuta ativa, e remeça a PA.
- Sem resolução: Anti-hipertensivo oral de início rápido: captopril 25 mg via oral (não sublingual, pico em 60 a 90 minutos) ou clonidina; ou ajuste o anti-hipertensivo crônico; ou inicie tratamento.

USO ORAL:
1. CAPTOPRIL 25 MG ---------- 2 comprimidos
Tomar 1 a 2 comprimidos agora. Reavaliar em em 60 a 90 minutos novamente ou se surgimento de sintomas.

SINAIS DE ALERTA:
Déficit neurológico focal, disartria, rigidez de nuca, alteração do nível de consciência, convulsão. Cefaleia intensa com náuseas ou vômitos, alteração visual aguda. Dor torácica, dispneia, ortopneia. Dor torácica dorsal ou abdominal, assimetria de pulsos, diferença de PA entre membros. Redução do volume urinário, edema, urina espumosa ou com sangue. Gestante ou puérpera com PA elevada e sinais de gravidade.

_____ / _____ / _____ _____

Data Carimbo e assinatura