RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Exacerbação — antibiótico (só se escarro purulento, cultura prévia positiva ou ventilação mecânica) 】

USO ORAL:

1. Amoxicilina + Clavulanato 875/125 mg ---- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.
1. Azitromicina 500 mg ---------- 5 comprimidos
Tomar 1 comprimido ao dia por 3 a 5 dias.
1. Doxiciclina 100 mg ---------- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.

Use os inaladores todos os dias no horário, com espaçador quando indicado e enxaguando a boca após o corticoide inalatório. Leve os dispositivos às consultas para revisar a técnica. Parar de fumar é o que mais muda o rumo da doença — peça ajuda à equipe. Mantenha as vacinas em dia (gripe, pneumococo, COVID) e faça atividade física; a reabilitação pulmonar ajuda muito.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Falta de ar intensa que não melhora com o resgate; lábios ou unhas arroxeados; sonolência ou confusão; febre alta; ou mais tosse/catarro ou catarro que muda de cor.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Exacerbação — antibiótico (só se escarro purulento, cultura prévia positiva ou ventilação mecânica) 】

USO ORAL:

1. Amoxicilina + Clavulanato 875/125 mg ---- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.
1. Azitromicina 500 mg ---------- 5 comprimidos
Tomar 1 comprimido ao dia por 3 a 5 dias.
1. Doxiciclina 100 mg ---------- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.

Use os inaladores todos os dias no horário, com espaçador quando indicado e enxaguando a boca após o corticoide inalatório. Leve os dispositivos às consultas para revisar a técnica. Parar de fumar é o que mais muda o rumo da doença — peça ajuda à equipe. Mantenha as vacinas em dia (gripe, pneumococo, COVID) e faça atividade física; a reabilitação pulmonar ajuda muito.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Falta de ar intensa que não melhora com o resgate; lábios ou unhas arroxeados; sonolência ou confusão; febre alta; ou mais tosse/catarro ou catarro que muda de cor.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico