RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Líquidos caseiros ou sais de reidratação oral (SRO) 500 mg ---- 20 cps
Tomar líquidos caseiros (água, chá, suco, água de coco, sopas) ou SRO. Adulto: pelo menos 200 mL a cada evacuação diarreica.
Criança: menores de 1 ano 50 a 100 mL; de 1 a 10 anos 100 a 200 mL a cada evacuação.
1. Hidraplex pó para solução oral 500 mg ---------- 1 sachê
Diluir o conteúdo de 1 sachê em 1 litro de água filtrada ou fervida e tomar pelo menos 200 mL a cada evacuação diarreica.

2. Dipirona 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
2. Paracetamol 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
2. Dipirona 500 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 20 a 40 gotas de 6 em 6 horas se dor ou febre.
2. Paracetamol 200 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 35 a 55 gotas de 6 em 6 horas se dor ou febre.

3. Escopolamina 10 mg ---------- 20 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor abdominal.
3. Escopolamina 10 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar 20 a 40 gotas de 8 em 8 horas se dor abdominal.

4. Metoclopramida 10 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náuseas ou vômitos.
4. Ondansetrona 4 mg ---------- 20 cps
Tomar 1 comprimido, via oral, de 8/8h, se náusea ou vômito.

5. Loperamida 2 mg ---------- 10 cps
Tomar 2 comprimidos após a primeira evacuação, seguido de 1 comprimido após cada evacuação subsequente. Usar por até 2 dias.
Dose máxima: 8 comprimidos/dia.
5. Racecadotrila 100 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 2 a 3 dias.

6. Floratil AT 250 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas.
6. Repoflor 250 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas.

Instruções ao paciente:
Beba líquidos em pequenas quantidades e com frequência após cada evacuação e cada vômito, de preferência o soro de reidratação oral. Evite refrigerantes e não adoce demais.
Mantenha a alimentação normal e o peito, se for o caso; não é preciso ficar em jejum.
Use os remédios só conforme a orientação; não use remédio para "segurar" a diarreia por conta própria.
Lave bem as mãos e cuide da água e do preparo dos alimentos.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Não conseguir beber ou vomitar tudo o que ingere
Muita sonolência, moleza ou prostração
Urinar pouco, boca muito seca, olhos fundos
Sangue nas fezes
Febre alta que não cede
Diarreia por 14 dias ou mais

__/__/__ _____

Data Carimbo e assinatura