RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Omeprazol 20 mg ---------- 60 cps
Tomar 1 comprimido em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, por 8 semanas

2. Domperidona 10 mg ---------- 20 cps
Tomar 1 comprimido 30 minutos antes das refeições se dor no estômago, náusea ou sensação de plenitude gástrica.
2. Metoclopramida 10 mg ---------- 20 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor no estômago, náusea ou sensação de plenitude gástrica.

3. Hidróxido de Magnésio 10 mg/2 mL ---------- 1 frasco
Tomar 10 mL após as refeições principais ou se queimação.

USO ENDOVENOSO:

4. Buscopan Composto (Escopolamina 20 mg + Dipirona 2,5 g / 5 mL) ---- 1 ampola
Diluir 5 mL em 15 mL de água destilada e administrar via endovenosa de 8 em 8 horas.

5. Bromoprida 10 mg/2 mL ---------- 1 ampola
Diluir 2 mL em 18 mL de água destilada e administrar via endovenosa.
5. Metoclopramida 10 mg/2 mL ---------- 1 ampola
Diluir 2 mL em 50 mL de SF 0,9% e administrar via endovenosa em 15 minutos.

Instruções ao paciente:
Elevar a cabeceira da cama. Comer pelo menos 2 horas antes de deitar. Evitar refeições volumosas. Parar de fumar. Evitar café, chocolate, cítricos, frituras, bebidas alcoólicas e refrigerantes.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
vômito com sangue, dor súbita e muito intensa ou dor que não melhora com a medicação

_____ / _____ / _____ _____

Data Carimbo e assinatura