RECEITUÁRIO

Nome: _____

USO ORAL:

1. Dipirona OU paracetamol 500mg ----------20 comprimidos
   Tomar até 2 comprimido de 6 em 6 horas se dor.

2. Cetoprofeno 100 mg ----------10 comprimidos
   Tomar 1 cp de 12 em 12 horas por 5 dias por até 5 dias

OU

2. Ibuprofeno 600 mg ----------20 comprimidos
   Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor por até 7 dias

PROCURE A EMERGÊNCIA SE: Febre (> 38°C) por mais de 3 dias, dor fixa em virilha e/ou testículos, dor que não alivia com as medicações, parada de eliminação de urina ou fezes, queda do estado geral.

/ /

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

RECEITUÁRIO

Nome: _____

USO EV:

1.Dipirona 1g/2mL ----------1 ampola
   Administrar 1 ampola de 2 mL + 18 mL de água destilada agora

2. Cetoprofeno 50 mg/ml ---------- 1 ampola
   Administrar 1 ampola de 2 mL EV em infusão por 20 minutos. Diluir 100 mg em 100 a 150 ml de SF 0,9% ou SG 5%. Dose máxima 300 mg/dia.

OU

2. Tenoxicam 20 mg ---------- 1 ampola

   Administrar 1 ampola de 2 mL EV direta. Reconstituir 10 mg + 2 mL de diluente próprio ou água para injetáveis. Dose máxima 40 mg/dia.

/ /

DATA

CARIMBO E ASSINATURA