RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Dipirona 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor.
1. Paracetamol 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor.
1. Dipirona 500 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 20 a 40 gotas de 6 em 6 horas se dor.
1. Paracetamol 200 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 35 a 55 gotas de 6 em 6 horas se dor.

2. Muvinlax 250 mg ---------- sachês
Tomar 1 a 3 sachês ao dia por 14 dias.

USO RETAL:

3. Proctyl pomada 500 mg ---------- 1 tubo
Aplicar via retal 3 vezes ao dia por 2 semanas.
3. Nifedipino 0,2% gel (manipulado) ---------- 1 tubo
Aplicar fina camada 3 vezes ao dia por 6 a 8 semanas.

Instruções ao paciente:
Banho de assento com água morna 3 vezes ao dia. Lavar a região com água e sabão neutro — não usar papel higiênico ou lenço umedecido. Tratar a constipação. Aumentar o consumo de fibras e água.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
sangramento intenso, dor que não melhora com a medicação ou febre

__/__/__ _____

Data Carimbo e assinatura