RECEITUÁRIO

Nome: _____

GOTA AGUDA

Uso oral:

1. Ibuprofeno 600 mg ……..
……21 cps

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5-7 dias. Repousar com o membro elevado e aplicar gelo por 20 minutos a cada 2-3 horas.

OU

1. Prednisona 5 mg ou 20 mg …….
……21 cps

Tomar 40 mg em dose única diária pela manhã , por 7-10 dias. Repousar com o membro elevado e aplicar gelo por 20 minutos a cada 2-3 horas.

OU

1.Cochicina 0,5 mg
…… 4 cps

Tomar 1,5 mg (3 comprimidos) ao primeiro sinal da crise, seguido de 0,5 mg (1 comprimido) uma hora depois, totalizando 2 mg em 1 hora, respeitando o máximo de 2 mg em 1 hora.
Em pacientes com insuficiência renal ou hepática grave, considerar dose única de 0,5 mg e não repetir antes de duas semanas

/ /
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

RECEITUÁRIO

Nome: _____

GOTA CRÔNICA

Uso oral:

1. Alopurinol 100 ou 300 mg …… Contínuo

Tomar X comp. (50-100-300 mg) VO 1x/dia.

OU

1. Colchicina 0,5 mg ……..... Contínuo

Tomar 1 comp. VO uma a três vezes ao dia por 3–6 meses.

/ /
DATA

CARIMBO E ASSINATURA