RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Profilaxia antibiótica contínua (à noite; só após urocultura negativa; 6 a 12 meses) 】

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite. Evitar na disfunção renal e no fim da gestação.
1. Sulfametoxazol + Trimetoprima 200/40 mg ---- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite.
1. Cefalexina 250 mg ---------- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite.

【 Profilaxia antibiótica pós-coital (dose única após a relação) 】

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 1 caixa
Tomar 1 comprimido após a relação sexual (quando as ITU se relacionam ao coito).

Muitas infecções de repetição são novas infecções — dá para prevenir. Beba mais água ao longo do dia (cerca de 1,5 L a mais), não segure a urina e urine após a relação sexual; evite espermicida. Na menopausa, o creme vaginal de estrogênio ajuda. Se for indicado antibiótico preventivo, tome exatamente como orientado; faremos urocultura a cada crise. Iniciar a profilaxia só após a urocultura negativa.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Febre, dor lombar ou vômitos (pielonefrite); sangue na urina; nos homens, procurar avaliação.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Profilaxia antibiótica contínua (à noite; só após urocultura negativa; 6 a 12 meses) 】

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite. Evitar na disfunção renal e no fim da gestação.
1. Sulfametoxazol + Trimetoprima 200/40 mg ---- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite.
1. Cefalexina 250 mg ---------- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite.

【 Profilaxia antibiótica pós-coital (dose única após a relação) 】

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 1 caixa
Tomar 1 comprimido após a relação sexual (quando as ITU se relacionam ao coito).

Muitas infecções de repetição são novas infecções — dá para prevenir. Beba mais água ao longo do dia (cerca de 1,5 L a mais), não segure a urina e urine após a relação sexual; evite espermicida. Na menopausa, o creme vaginal de estrogênio ajuda. Se for indicado antibiótico preventivo, tome exatamente como orientado; faremos urocultura a cada crise. Iniciar a profilaxia só após a urocultura negativa.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Febre, dor lombar ou vômitos (pielonefrite); sangue na urina; nos homens, procurar avaliação.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico