# RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

*1ª Via - Farmácia*
*2ª Via - Paciente*

Paciente: _____

Endereço: _____

**Prescrição:**

【 Incontinência de esforço — 2ª linha (após fisioterapia; a terapia comportamental é superior) 】

USO ORAL:

1. Duloxetina 30 mg ---------- 60 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas. Efeitos adversos (náusea) limitam; reservar quando a paciente prefere fármaco à cirurgia.

Incontinência é comum e tem tratamento — não é 'coisa da idade'. A base são os exercícios do assoalho pélvico (Kegel) e o treino da bexiga, que funcionam bem quando feitos com regularidade (dê pelo menos 3 meses). Ajuda perder peso, reduzir café e bebidas à noite, evitar prisão de ventre e ir ao banheiro em horários combinados. Os medicamentos abaixo complementam essas medidas.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Sangue na urina, dor, febre, dificuldade para urinar, ou perda súbita com fraqueza nas pernas/dormência — procure atendimento.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

**IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR**

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico


# RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

*1ª Via - Farmácia*
*2ª Via - Paciente*

Paciente: _____

Endereço: _____

**Prescrição:**

【 Incontinência de esforço — 2ª linha (após fisioterapia; a terapia comportamental é superior) 】

USO ORAL:

1. Duloxetina 30 mg ---------- 60 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas. Efeitos adversos (náusea) limitam; reservar quando a paciente prefere fármaco à cirurgia.

Incontinência é comum e tem tratamento — não é 'coisa da idade'. A base são os exercícios do assoalho pélvico (Kegel) e o treino da bexiga, que funcionam bem quando feitos com regularidade (dê pelo menos 3 meses). Ajuda perder peso, reduzir café e bebidas à noite, evitar prisão de ventre e ir ao banheiro em horários combinados. Os medicamentos abaixo complementam essas medidas.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Sangue na urina, dor, febre, dificuldade para urinar, ou perda súbita com fraqueza nas pernas/dormência — procure atendimento.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

**IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR**

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico