RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Metoclopramida 10 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náuseas ou vômitos.
1. Bromoprida 10 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náuseas ou vômitos.
1. Ondansetrona 4 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náuseas ou vômitos.
1. Dramin B6 (Dimenidrinato + Piridoxina) 50 mg + 10 mg ---- 10 cps
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas se náuseas ou vômitos.
1. Ondansetrona 8 mg ---------- 60 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náuseas ou vômitos.

USO ENDOVENOSO:

2. Metoclopramida 10 mg/2 mL ---------- 1 ampola
Diluir 2 mL em 50 mL de SF 0,9% e administrar via endovenosa em 15 minutos.
2. Bromoprida 10 mg/2 mL ---------- 1 ampola
Diluir 2 mL em 18 mL de água destilada e administrar via endovenosa lenta em 3 a 5 minutos.
2. Ondansetrona 4 mg/2 mL ---------- 1 ampola
Administrar 2 mL via endovenosa em 2 a 5 minutos, sem diluição.
2. Ondansetrona 8 mg/4 mL ---------- 1 ampola
Diluir 4 mL em 50 mL de SF 0,9% e administrar via endovenosa em 15 minutos. Doses maiores de 8 mg até 16 mg devem ser diluidas em 50 a 100 mL de SF 0,9% ou SG5%. Doses menores de 8mg não precisam ser diluidas.
2. Dramin B6 DL 120 mg ---------- 1 ampola (10 mL)
Diluir 10 mL em 10 mL de SF 0,9% e administrar via endovenosa em 2 minutos.

Instruções ao paciente:
Ingerir líquidos em pequenos goles e com frequência. Preferir alimentos leves e sem gordura. Repousar com a cabeceira levemente elevada. Evitar cheiros fortes.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
incapacidade de ingerir líquidos, diminuição da urina, vômitos que não melhoram com a medicação, sonolência excessiva ou queda do estado geral

__/__/__ _____

Data Carimbo e assinatura