RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

USO ORAL:

1. Carbamazepina 200 mg ---------- 60 comprimidos
Iniciar 100 mg VO 2x/dia e titular; usual 200 mg de 8/8h (faixa 200 a 1.200 mg/dia). Controle inicial 75 a 90%.
1. Oxcarbazepina 300 mg ---------- 60 comprimidos
300 a 1.800 mg/dia VO. Menos interações; monitore o sódio (hiponatremia).
1. Lamotrigina 25 mg ---------- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido por dia e titular conforme resposta até 400 mg/dia, com titulaçao lenta.
1. Gabapentina 300 mg ---------- 60 comprimidos
Tomar 1 comprimido 2 vezes ao dia e aumentar conforme resposta até 900 a 3.600 mg/dia VO, dividida, com titulação.
1. Pregabalina 75 mg ---------- 60 comprimidos
Tomar 1 comprimido 1 noite e titular até 150 a 600 mg/dia VO, dividida.

Instruções ao paciente:
Tome a carbamazepina todos os dias; a dose sobe aos poucos. Não pare de repente (a interrupção abrupta pode piorar as crises).
Nas crises, evite tocar as zonas gatilho; prefira alimentos macios e água morna.
Faça os exames de sangue de controle e avise sobre todos os medicamentos que usa (interações).

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Dormência ou fraqueza no rosto.
Alteração da visão, olho vermelho e doloroso.
Feridas ou bolhas na pele do rosto.
Dor que não melhora com o tratamento.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

USO ORAL:

1. Carbamazepina 200 mg ---------- 60 comprimidos
Iniciar 100 mg VO 2x/dia e titular; usual 200 mg de 8/8h (faixa 200 a 1.200 mg/dia). Controle inicial 75 a 90%.
1. Oxcarbazepina 300 mg ---------- 60 comprimidos
300 a 1.800 mg/dia VO. Menos interações; monitore o sódio (hiponatremia).
1. Lamotrigina 25 mg ---------- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido por dia e titular conforme resposta até 400 mg/dia, com titulaçao lenta.
1. Gabapentina 300 mg ---------- 60 comprimidos
Tomar 1 comprimido 2 vezes ao dia e aumentar conforme resposta até 900 a 3.600 mg/dia VO, dividida, com titulação.
1. Pregabalina 75 mg ---------- 60 comprimidos
Tomar 1 comprimido 1 noite e titular até 150 a 600 mg/dia VO, dividida.

Instruções ao paciente:
Tome a carbamazepina todos os dias; a dose sobe aos poucos. Não pare de repente (a interrupção abrupta pode piorar as crises).
Nas crises, evite tocar as zonas gatilho; prefira alimentos macios e água morna.
Faça os exames de sangue de controle e avise sobre todos os medicamentos que usa (interações).

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Dormência ou fraqueza no rosto.
Alteração da visão, olho vermelho e doloroso.
Feridas ou bolhas na pele do rosto.
Dor que não melhora com o tratamento.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico