RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Dipirona 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor.
1. Paracetamol 500 mg ---------- 20 cps
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor.
1. Dipirona 500 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 20 a 40 gotas de 6 em 6 horas se dor.
1. Paracetamol 200 mg/mL ---------- 1 frasco
Tomar de 35 a 55 gotas de 6 em 6 horas se dor.

2. Ibuprofeno 600 mg ---------- 21 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor por até 7 dias.
2. Cetoprofeno 100 mg ---------- 10 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por até 7 dias.
2. Diclofenaco 50 mg ---------- 21 cps
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor por até 7 dias.
2. Nimesulida 100 mg ---------- 14 cps
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas se dor por até 7 dias.
2. Tenoxicam 20 mg ---------- 7 cps
Tomar 1 comprimido por dia se dor por até 7 dias.
2. Cetorolaco 10 mg ---------- 7 cps
Tomar 1 comprimido via sublingual de 8 em 8 horas por até 7 dias se dor.

Instruções ao paciente:
Não molhar o ouvido durante o tratamento. Usar algodão com um pouco de óleo para proteger durante o banho. Fazer compressa morna e seca no ouvido 2 vezes ao dia. Não usar cotonetes dentro do ouvido.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
febre, inchaço ou vermelhidão ao redor do ouvido ou no pescoço, vômitos, tontura intensa ou ausência de melhora em 72 horas

_____ / / _____ _____

Data Carimbo e assinatura