RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Controle da otorreia — 1ª opção (quinolona tópica, segura na perfuração) 】

USO OTOLÓGICO:

1. Ciprofloxacino gotas otológicas 0,3% ---- 1 frasco
Pingar 3 gotas no ouvido afetado 2 vezes ao dia por 7 a 14 dias, associado à limpeza. Segura na membrana perfurada (sem ototoxicidade).
1. Ofloxacino gotas otológicas 0,3% -------- 1 frasco
Pingar as gotas no ouvido afetado 1 vez ao dia por 7 a 14 dias (permite dose única diária).

A limpeza do ouvido (aural toilet) é coadjuvante — melhora a penetração do medicamento tópico. EVITE gotas com aminoglicosídeos (neomicina/gentamicina) pelo risco de ototoxicidade através da perfuração — prefira sempre fluoroquinolona ou antisséptico. O antibiótico sistêmico (oral) é raramente indicado — reserve para impossibilidade da via tópica ou complicação (celulite, mastoidite, complicação intracraniana), guiado por cultura. O colesteatoma não tem tratamento clínico — o manejo é cirúrgico; o tópico apenas controla a otorreia até o encaminhamento ao especialista.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Dor intensa, febre, inchaço ou vermelhidão atrás da orelha, tontura, paralisia facial ou piora da audição — sinais de complicação.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Controle da otorreia — 1ª opção (quinolona tópica, segura na perfuração) 】

USO OTOLÓGICO:

1. Ciprofloxacino gotas otológicas 0,3% ---- 1 frasco
Pingar 3 gotas no ouvido afetado 2 vezes ao dia por 7 a 14 dias, associado à limpeza. Segura na membrana perfurada (sem ototoxicidade).
1. Ofloxacino gotas otológicas 0,3% -------- 1 frasco
Pingar as gotas no ouvido afetado 1 vez ao dia por 7 a 14 dias (permite dose única diária).

A limpeza do ouvido (aural toilet) é coadjuvante — melhora a penetração do medicamento tópico. EVITE gotas com aminoglicosídeos (neomicina/gentamicina) pelo risco de ototoxicidade através da perfuração — prefira sempre fluoroquinolona ou antisséptico. O antibiótico sistêmico (oral) é raramente indicado — reserve para impossibilidade da via tópica ou complicação (celulite, mastoidite, complicação intracraniana), guiado por cultura. O colesteatoma não tem tratamento clínico — o manejo é cirúrgico; o tópico apenas controla a otorreia até o encaminhamento ao especialista.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Dor intensa, febre, inchaço ou vermelhidão atrás da orelha, tontura, paralisia facial ou piora da audição — sinais de complicação.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico