RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

【 Sintomáticos 】

USO ORAL:

1. Dipirona 500 mg ---------- 20 comprimidos
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
1. Paracetamol 500 mg ---------- 20 comprimidos
Tomar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
2. Metoclopramida 10 mg ---------- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náuseas ou vômitos.
2. Ondansetrona 4 a 8 mg ---------- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náuseas ou vômitos.

Colha a urocultura ANTES de iniciar o antibiótico. Tome o antibiótico até o fim, no horário. A melhora costuma começar em 48 a 72 horas — reavalie nesse prazo. Beba bastante líquido. Volte antes se vômitos que impeçam tomar o remédio, piora da dor lombar, febre que não cede ou muita prostração.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Mau estado geral, pressão baixa, batimentos acelerados ou confusão (sepse); vômitos incoercíveis; dor tipo cólica intensa com incapacidade de urinar (obstrução); gestante com pielonefrite.

/ /

Data

Carimbo e assinatura