RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Ambulatorial — pielonefrite não complicada (colher urocultura antes) 】

USO ORAL:

1. Ciprofloxacino 500 mg ---------- 14 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias.
1. Levofloxacino 750 mg ---------- 5 comprimidos
Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 5 dias.

【 Complicada, gestante ou sepse — 1ª dose e encaminhar/internar 】

USO INTRAMUSCULAR:

1. Ceftriaxona 1 g ---------- 1 a 2 frascos
Aplicar 1 g intramuscular ou endovenosa como dose inicial e encaminhar. Na internação, manter 1 g ao dia. Gestante: 14 dias totais (alternativa: ampicilina + gentamicina).

【 Gestante — profilaxia supressiva até o parto (após o tratamento) 】

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite até o parto (evitar a partir de 36 a 38 semanas). Urocultura mensal.
1. Cefalexina 500 mg ---------- 1 caixa/mês

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição:

【 Ambulatorial — pielonefrite não complicada (colher urocultura antes) 】

USO ORAL:

1. Ciprofloxacino 500 mg ---------- 14 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias.
1. Levofloxacino 750 mg ---------- 5 comprimidos
Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 5 dias.

【 Complicada, gestante ou sepse — 1ª dose e encaminhar/internar 】

USO INTRAMUSCULAR:

1. Ceftriaxona 1 g ---------- 1 a 2 frascos
Aplicar 1 g intramuscular ou endovenosa como dose inicial e encaminhar. Na internação, manter 1 g ao dia. Gestante: 14 dias totais (alternativa: ampicilina + gentamicina).

【 Gestante — profilaxia supressiva até o parto (após o tratamento) 】

USO ORAL:

1. Nitrofurantoína 100 mg ---------- 1 caixa/mês
Tomar 1 comprimido à noite até o parto (evitar a partir de 36 a 38 semanas). Urocultura mensal.
1. Cefalexina 500 mg ---------- 1 caixa/mês

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico