# RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

*1ª Via - Farmácia*
*2ª Via - Paciente*

Paciente: _____

Endereço: _____

**Prescrição:**

【 NIH II — prostatite bacteriana crônica (urocultura positiva; 4 a 6 semanas) 】

USO ORAL:

1. Ciprofloxacino 500 mg ---------- 56 a 84 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 4 a 6 semanas.
1. Levofloxacino 500 mg ---------- 28 a 42 comprimidos
Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 4 a 6 semanas.
1. Sulfametoxazol + Trimetoprima 800/160 mg ---- 56 a 84 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 4 a 6 semanas (alternativa).

【 SDPC (UPOINT) — dor neuropática / componente psicossocial 】

USO ORAL:

1. Amitriptilina 25 mg ---------- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido (10 a 25 mg) à noite; titular conforme tolerância.

【 SDPC (UPOINT) — dor neuropática 】

USO ORAL:

1. Pregabalina 75 mg ---------- 60 cápsulas
Tomar 1 cápsula de 12 em 12 horas; titular conforme resposta.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

**IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR**

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico


# RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Nome: _____

CRM: _____ UF: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

*1ª Via - Farmácia*
*2ª Via - Paciente*

Paciente: _____

Endereço: _____

**Prescrição:**

【 NIH II — prostatite bacteriana crônica (urocultura positiva; 4 a 6 semanas) 】

USO ORAL:

1. Ciprofloxacino 500 mg ---------- 56 a 84 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 4 a 6 semanas.
1. Levofloxacino 500 mg ---------- 28 a 42 comprimidos
Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 4 a 6 semanas.
1. Sulfametoxazol + Trimetoprima 800/160 mg ---- 56 a 84 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 4 a 6 semanas (alternativa).

【 SDPC (UPOINT) — dor neuropática / componente psicossocial 】

USO ORAL:

1. Amitriptilina 25 mg ---------- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido (10 a 25 mg) à noite; titular conforme tolerância.

【 SDPC (UPOINT) — dor neuropática 】

USO ORAL:

1. Pregabalina 75 mg ---------- 60 cápsulas
Tomar 1 cápsula de 12 em 12 horas; titular conforme resposta.

Data: _____/_____/_____

_____
Carimbo / Assinatura

**IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR**

Nome: _____

_____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

_____

Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

_____ Data: ____/____/____
Assinatura do Farmacêutico