Sífilis na Gestação
Informações para pacientes

O que é?

Sífilis é uma infecção causada por uma bactéria. É transmitida através de relações sexuais sem preservativo ou da mãe para o bebê durante a gestação. Tem cura com tratamento adequado.

Por que é perigosa na gestação?

Quando a gestante tem sífilis e não é tratada, a bactéria passa para o bebê através da placenta, causando a sífilis congênita.

A sífilis congênita pode causar: aborto espontâneo, parto prematuro, morte do bebê ao nascer, baixo peso, problemas graves nos ossos, fígado, baço, cérebro, olhos, ouvidos e pele, e sequelas permanentes. Por isso o diagnóstico e tratamento no pré-natal são fundamentais.

Sintomas

Muitas gestantes não apresentam sintomas. Quando aparecem, podem ser:

- Ferida (cancro) na região genital, ânus ou boca que não dói e desaparece sozinha, mas a doença continua.
- Manchas vermelhas no corpo, principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés, febre, mal-estar e ínguas.

Por isso os exames de sangue no pré-natal são essenciais, mesmo sem sintomas.

Como é diagnosticada?

O diagnóstico é feito através de exames de sangue durante o pré-natal. O teste rápido pode ser feito na unidade de saúde com resultado em 30 minutos. Todo pré-natal deve incluir pelo menos dois exames: **um no primeiro trimestre e outro no terceiro trimestre.**

Tratamento

O tratamento é feito com penicilina benzatina (benzilpenicilina benzatina), aplicada através de injeções. É o único medicamento capaz de tratar a gestante e prevenir a transmissão para o bebê.

Para o tratamento ser considerado adequado na gestação, é necessário:

- Usar benzilpenicilina benzatina (penicilina benzatina).
- Completar o esquema de tratamento correto para a fase da doença até pelo menos 30 dias antes do parto.
- Respeitar o intervalo máximo de 9 dias entre as doses. Se ultrapassar esse prazo, o tratamento deve ser reiniciado desde o início.

Por isso, não falte às aplicações programadas. Marque bem as datas e compareça no dia certo para receber cada dose. O tratamento é gratuito no SUS.

APSmais
O apoio inteligente da Atenção Primária

Sífilis na Gestação
Informações para pacientes

Tratamento do parceiro

Seu parceiro também deve ser testado e tratado, mesmo sem sintomas. Se ele não for tratado, você pode se infectar novamente. Evite relações sexuais até ambos completarem o tratamento, ou use preservativo.

Acompanhamento

Após o tratamento, você fará exames mensais durante a gestação para verificar se está funcionando. O bebê também precisará ser acompanhado após o nascimento. Se o tratamento foi adequado e precoce, as chances de o bebê nascer saudável são muito boas.

Prevenção

- Use preservativo em todas as relações sexuais. É a melhor forma de prevenir sífilis e outras infecções.
- Faça todos os exames do pré-natal.
- Converse com seu parceiro sobre fazer os exames juntos.
- Mesmo se você já teve sífilis e foi curada, pode se infectar novamente. Continue usando preservativo.

Sinais de alerta

Procure atendimento se: aparecer ferida na região genital, ânus ou boca, surgirem manchas vermelhas pelo corpo, especialmente nas mãos e pés, ou se tiver relação sexual sem preservativo com alguém que possa ter sífilis.

Importante lembrar

- A sífilis tem cura. Com tratamento adequado, você e seu bebê ficarão bem.
- Complete todas as doses do tratamento no prazo correto. Não deixe passar mais de 9 dias entre uma dose e outra.
- O tratamento precisa estar completo pelo menos 30 dias antes do parto para proteger adequadamente seu bebê.
- Certifique-se de que seu parceiro também faça o tratamento.
- Continue o pré-natal regularmente. O acompanhamento é fundamental.
- Não tenha vergonha de falar sobre o diagnóstico com os profissionais de saúde. Eles estão ali para ajudar você.

APSmais
O apoio inteligente da Atenção Primária