RECEITUÁRIO SIMPLES

Nome: _____

USO ORAL:

1. Verapamil 80 mg ---------- 30 comprimidos
Iniciar 80 mg VO 3x/dia, titular a cada 10 a 14 dias (ECG). Manutenção 240 a 320 mg/dia (refratários até 720 a 960 mg/dia sob supervisão).

2. Prednisona 20 mg ---------- 20 comprimidos
60 a 80 mg/dia por 3 dias, com desmame ao longo de 2 semanas (ponte até o verapamil agir).

3. Carbonato de lítio 300 mg ---------- 60 comprimidos
300 a 900 mg/dia VO, se não houver resposta ao verapamil.

Instruções ao paciente:
Tome o verapamil todos os dias durante o período das salvas, inclusive nos dias sem dor.
Evite bebida alcoólica e vasodilatadores (nitratos) durante o período das salvas.
Nas crises, use o oxigênio ou o sumatriptano injetável conforme orientado.

SINAIS DE ALERTA — RETORNAR SE:
Primeira vez que sente essa dor.
A dor muda de padrão ou fica diferente do habitual.
Febre com rigidez de nuca.
Fraqueza, formigamento ou alteração da visão.

_____ / _____ / _____ _____

Data Carimbo e assinatura